



Desafío 1

Se pateo un tiro libre desde un punto situado frente al arco a una distancia de 25 metros, con una velocidad inicial de 18 m/s y un ángulo de 30° . Determinar la altura a la cual la pelota cruza la línea de meta, suponiendo que la misma sigue una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. ¿Fue gol?

 Tomar $\text{tg}(30^\circ) \approx 0.577$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, con lo cual $\cos^2(30^\circ) = \frac{3}{4}$.



Desafío 2

Problema

Se pateo un tiro libre desde un punto situado frente al arco a una distancia de 25 metros, con una velocidad inicial de 22 m/s y un ángulo de 20° . Determinar la altura a la cual la pelota cruza la línea de meta, suponiendo que la misma sigue una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. ¿Fue gol?

 Tomar $\text{tg}(20^\circ) \approx 0.364$ y $\cos^2(20^\circ) \approx 0.883$.



Desafío 3

Problema

Se pateo un tiro libre desde un punto frente al arco, con una velocidad inicial de 15 m/s y un ángulo de 45° . Determinar la distancia desde el punto de disparo hasta el arco sabiendo que la pelota cruzó la línea de meta cuando se encontraba bajando, a una altura de 2.58 metros, por lo que no terminó en gol. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear el resultado al entero más cercano).

 Notar que $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$.



Desafío 3

Problema A

Se pateo un tiro libre desde un punto frente al arco, con una velocidad inicial de 15 m/s y un ángulo de 45° . Determinar la distancia desde el punto de disparo hasta el arco sabiendo que la pelota cruzó la línea de meta cuando se encontraba bajando, a una altura de 2.58 metros, por lo que no terminó en gol. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear el resultado al entero más cercano).

 Notar que $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$. Además, $\operatorname{sen}(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \operatorname{sen}(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema B

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta cruzar la línea de meta.

Problema C

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta llegar al suelo, suponiendo que nada se interpone en su trayectoria.



Desafío 4

Problema

Se patea un tiro libre desde un punto frente al arco, con una velocidad inicial de 14 m/s y un ángulo de 45° . Determinar la distancia desde el punto de disparo hasta el arco sabiendo que la pelota llegó a la línea de meta cuando se encontraba bajando, a una altura de 1.8 metros. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear el resultado al entero más cercano).



Notar que $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$.



Desafío 4

Problema A

Se patea un tiro libre desde un punto frente al arco, con una velocidad inicial de 14 m/s y un ángulo de 45° . Determinar la distancia desde el punto de disparo hasta el arco sabiendo que la pelota llegó a la línea de meta cuando se encontraba bajando, a una altura de 1.8 metros. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear el resultado al entero más cercano).



Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$. Además, $\operatorname{sen}(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \operatorname{sen}(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema B

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta cruzar la línea de meta.

Problema C

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta llegar al suelo.



Desafío 5

Problema

Se pateo un tiro libre desde un punto situado frente al arco a una distancia de 20 metros, con un ángulo de 30° . Determinar la velocidad inicial del disparo, sabiendo que la pelota cruzó la línea de meta a una altura de 1.34 metros. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear v_0 al entero más cercano).



Tomar $\text{tg}(30^\circ) \approx 0.577$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, con lo cual $\cos^2(30^\circ) = \frac{3}{4}$



Desafío 5

Problema A

Se pateo un tiro libre desde un punto situado frente al arco a una distancia de 20 metros, con un ángulo de 30° . Determinar la velocidad inicial del disparo, sabiendo que la pelota cruzó la línea de meta a una altura de 1.34 metros. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear v_0 al entero más cercano).



Tomar $\text{tg}(30^\circ) \approx 0.577$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, con lo cual $\cos^2(30^\circ) = \frac{3}{4}$. Además, $\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \sin(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema B

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta cruzar la línea de meta.

Problema C

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta llegar al suelo.



Desafío 6

Problema

Se pateo un tiro libre desde un punto situado frente al arco a una distancia de 24 metros, con un ángulo de 30° . Determinar la velocidad inicial del disparo, sabiendo que la pelota cruzó la línea de meta a una altura de 2.24 metros. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear v_0 al entero más cercano).



Tomar $\text{tg}(30^\circ) \approx 0.577$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, con lo cual $\cos^2(30^\circ) = \frac{3}{4}$.



Desafío 6

Problema A

Se pateo un tiro libre desde un punto situado frente al arco a una distancia de 24 metros, con un ángulo de 30° . Determinar la velocidad inicial del disparo, sabiendo que la pelota cruzó la línea de meta a una altura de 2.24 metros. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear v_0 al entero más cercano).



Tomar $\text{tg}(30^\circ) \approx 0.577$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, con lo cual $\cos^2(30^\circ) = \frac{3}{4}$. Además, $\text{sen}(30^\circ) = \frac{1}{2}$.

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \text{sen}(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema B

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta cruzar la línea de meta.

Problema C

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta llegar al suelo.



Desafío 7

Problema

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente x y y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \sin(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema

Problema: Se patea un tiro libre desde un punto situado frente al arco a una distancia de 18 metros, con una velocidad inicial de 20 m/s. Determinar el ángulo del disparo sabiendo que la pelota llegó a la línea de meta luego de 0.96 segundos desde su lanzamiento y utilizarlo para calcular la altura a la cual llegó el balón a dicha línea. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear a al entero más cercano).



Desafío 7

El alcance horizontal de un balón es el valor positivo de x cuando $y = 0$. Para el caso $y_0 = 0$, el mismo está dado, en metros, por

$$x_{\max} = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha)}{9.8}.$$

Problema A

Se patea un tiro libre con una velocidad inicial de 20 m/s. Determinar el ángulo del disparo, sabiendo que la pelota llegó por primera vez al suelo a los 26.24 metros de distancia desde el punto de disparo. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear a al entero más cercano).

Puede probarse que la altura máxima que alcanza un balón lanzado desde el suelo está dada, en metros, por

$$y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{19.6}.$$

Problema B

Hallar la altura máxima alcanzada por la pelota en el *Problema A*.



Desafío 8

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente x e y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \sin(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema

Se pateá un tiro libre desde un punto situado frente al arco a una distancia de 16 metros, con una velocidad inicial de 20 m/s. Determinar el ángulo del disparo sabiendo que la pelota llegó a la línea de meta luego de 0.85 segundos desde su lanzamiento y utilizarlo para calcular la altura a la cual llegó el balón a dicha línea. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear al entero más cercano).



Desafío 8

Puede probarse que la altura máxima que alcanza un balón lanzado desde el suelo está dada, en metros, por

$$y_{\max} = \frac{v_0^2 \sin^2(\alpha)}{19.6}.$$

Problema A

Se pateá un tiro libre con una velocidad inicial de 20 m/s. Determinar el ángulo del disparo, sabiendo que la pelota alcanza una altura máxima de 2.39 metros. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear al entero más cercano).

El alcance horizontal de un balón es el valor positivo de x cuando $y = 0$. Para el caso $y_0 = 0$, el mismo está dado, en metros, por

$$x_{\max} = \frac{v_0^2}{9.8}.$$

Problema B

Hallar el alcance horizontal del tiro realizado en el *Problema A*.



Desafío 9

El alcance horizontal de un balón es el valor positivo de x cuando $y = 0$. Para el caso $y_0 = 0$, el mismo está dado, en metros, por

$$x_{\max} = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}(2\alpha)}{9.8}.$$

Problema A

Se patea un tiro libre con un ángulo de disparo de 45° . Determinar la velocidad inicial del golpe, sabiendo que la pelota llegó por primera vez al suelo a los 10.2 metros de distancia desde el punto de disparo. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear v_0 al entero más cercano).

 Notar que $\operatorname{sen}(90^\circ) = 1$ y $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar el hecho que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, por lo que $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$.

Problema B

Hallar la altura a la cual cruza la línea de meta la pelota en el *Problema A*, si el disparo se realiza a una distancia de 7.48 metros desde el arco.



Desafío 10

Puede probarse que la altura máxima que alcanza un balón lanzado desde el suelo está dada, en metros, por

$$y_{\max} = \frac{v_0^2 \operatorname{sen}^2(\alpha)}{9.8}.$$

Problema A

Se patea un tiro libre con un ángulo de disparo de 45° . Determinar la velocidad inicial del tiro, sabiendo que la pelota alcanza una altura máxima de 4.31 metros. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear v_0 al entero más cercano).

 Notar que $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\operatorname{sen}(45^\circ) = \cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\operatorname{sen}^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$ y también $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$.

Problema B

Hallar la altura a la cual cruza la línea de meta la pelota en el *Problema A*, si el disparo se realiza a una distancia de 15 metros desde el arco.



Desafío 11

Problema A

Se pateo un tiro libre con un ángulo de disparo de 45° desde un punto situado a 14.3 metros de distancia al arco, y el tiro pega justo en el travesaño (es decir, llega a la línea de meta a 2.44 metros de altura). Determinar la velocidad inicial del tiro. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear v_0 al entero más cercano).



Notar que $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$.

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \operatorname{sen}(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema B

Hallar el tiempo que demora la pelota en el *Problema A*, desde el disparo hasta llegar a la línea de meta. El tiempo de vuelo t_v de un balón es la cantidad de tiempo que transcurre desde que es pateado hasta llegar por primera vez al suelo. Luego, es el valor positivo de t para el cual $y = 0$. El alcance horizontal x_{\max} de un balón es el valor positivo de x para el cual $y = 0$, que se obtiene también como el valor de x en t_v .

Problema C

Hallar el tiempo de vuelo de la pelota en el *Problema A* y su alcance horizontal.



Desafío 12

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \operatorname{sen}(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema

Se pateo un tiro libre desde un punto situado a 14 metros de distancia al arco con un ángulo de 40° , y la pelota llega a la línea de meta luego de 1.4 segundos de haber sido lanzada. Determinar la velocidad inicial del disparo, y si el mismo terminó o no en gol. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear v_0 al entero más cercano).



Desafío 13

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \sin(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema

Se pateá un tiro libre desde un punto situado a 14 metros de distancia al arco con una velocidad inicial de 15 m/s, y la pelota llega a la línea de meta luego de 1.08 segundos de haber sido lanzada. Determinar el ángulo del disparo, y si el mismo terminó o no en gol. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear a al entero más cercano).



Desafío 14

Puede probarse que un balón en movimiento parabólico alcanza su altura máxima luego de

$$t = \frac{v_0 \sin(\alpha)}{9.8}$$

segundos de haber sido lanzado.

Problema

Se pateá un tiro libre desde un punto situado a 38 metros de distancia al arco con una velocidad inicial de 26 m/s, y la pelota alcanza su altura máxima luego de 0.91 segundos de haber sido lanzada. Determinar el ángulo del disparo, y si el mismo terminó o no en gol. (Suponer que la pelota siguió una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe. Redondear a al entero más cercano).



Desafío 15

Problema

Una pelota pica y es pateada desde una altura de 0.5 metros, con un ángulo de 45° y una velocidad inicial de 13.12 m/s. ¿Desde qué distancia debe ejecutarse este tiro para que la pelota atraviese la línea de meta, cuando se encuentra bajando, a una altura de 2.2 metros?

 Notar que $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$.



Desafío 15

Problema A

Una pelota pica y es pateada desde una altura de 0.5 metros, con un ángulo de 45° y una velocidad inicial de 13.12 m/s. ¿Desde qué distancia debe ejecutarse este tiro para que la pelota atraviese la línea de meta, cuando se encuentra bajando, a una altura de 2.2 metros?

 Notar que $\operatorname{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$. Además, $\operatorname{sen}(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \operatorname{sen}(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema B

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta cruzar la línea de meta.

Problema C

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta llegar al suelo.



Desafío 16

Problema

Una pelota pica y es pateada desde una altura de 0.5 metros, con un ángulo de 45° y una velocidad inicial de 13.12 m/s. Supongamos que el tiro partió desde un punto situado frente al arco, a una distancia de 15 metros del mismo. Determinar si, en caso de no sufrir ningún tipo de desvío, pudo terminar en gol.

 Notar que $\text{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$.



Desafío 16

Problema A

Una pelota pica y es pateada desde una altura de 0.5 metros, con un ángulo de 45° y una velocidad inicial de 13.12 m/s. Supongamos que el tiro partió desde un punto situado frente al arco, a una distancia de 15 metros del mismo. Determinar la altura con la que llega la pelota a la línea de meta.

 Notar que $\text{tg}(45^\circ) = 1$. Para evitar redondeos innecesarios, utilizar que $\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, con lo cual $\cos^2(45^\circ) = \frac{1}{2}$. Además, $\sin(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \sin(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

Problema B

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta cruzar la línea de meta.

Problema C

Determinar el tiempo que demora la pelota del *Problema A* desde su lanzamiento hasta llegar al suelo.



Desafío 17

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \sin(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

El tiempo de vuelo t_v de un balón es la cantidad de tiempo que transcurre desde que es pateado hasta llegar por primera vez al suelo. Luego, es el valor positivo de t para el cual $y = 0$. El alcance horizontal x_{max} de un balón es el valor positivo de x para el cual $y = 0$, que se obtiene también como el valor de x en t_v .

Problema

Una pelota es pateada desde el piso, con una velocidad inicial de 13 m/s y un ángulo de 45°. Determinar el tiempo de vuelo y el alcance horizontal suponiendo que la misma sigue una trayectoria parabólica sin que nada la desvíe.



Desafío 18

También es posible conocer las posiciones horizontal y vertical del balón luego de t segundos de haber sido arrojado. Las mismas son, respectivamente y en metros, las siguientes:

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)t; \quad y(t) = y_0 + v_0 \sin(\alpha)t - 4.9t^2.$$

Así, luego de t segundos de haber sido lanzado, el balón se encuentra en el punto $P(t) = (x(t), y(t))$.

El tiempo de vuelo t_v de un balón es la cantidad de tiempo que transcurre desde que es pateado hasta llegar por primera vez al suelo. Luego, es el valor positivo de t para el cual $y = 0$.

Problema

Una pelota es pateada desde un punto situado en el piso a 31 metros frente al arco, con un ángulo de 30°. Sabiendo que sigue una trayectoria parabólica y que demora 2.041 segundos en volver al suelo, hallar la velocidad inicial del disparo y la altura a la cual la pelota llega a la línea de meta, suponiendo que nada se interpuso en su camino.